



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com
http:// www.moac.go.th



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และประเทศไทยตอนบน มีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. 67



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	บึงกาฬ	36.9	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	กำแพงเพชร	33.0	ฝนตกปานกลาง
3	อ.นครไทย	พิษณุโลก	13.6	ฝนตกปานกลาง
4	อ.คลองใหญ่	ตราด	10.6	ฝนตกปานกลาง
5	อ.สังขละบุรี	กาญจนบุรี	10.2	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 67)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,653 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,713 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (40,199 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 1,546 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 44.46 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 94.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 37,684 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,209 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,671 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (37,742 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 1,533 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 33.88 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 85.90 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,717 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	10,414	42	3,670	20	80	1,083	577	53	486	49	88	25,908	10,991	42	4,156	22	14,916
ตอน.	12	8,368	3,222	38	1,570	23	226	2,061	994	48	828	44	238	10,429	4,216	40	2,398	28	6,213
กลาง	3	1,419	268	19	208	15	27	419	126	30	102	26	30	1,838	394	21	310	18	1,443
ตะวันออก	2	26,605	17,010	64	3,733	28	8	164	54	33	43	28	10	26,769	17,064	64	3,775	28	9,705
ตะวันออก	6	1,515	509	34	415	29	52	1,006	407	40	351	37	58	2,520	916	36	765	32	1,604
ใต้	4	8,194	4,786	58	3,076	47	42	679	286	42	232	37	46	8,874	5,072	57	3,308	47	3,801
รวม	35	70,926	36,209	51	12,671	27	435	5,411	2,444	45	2,042	41	470	76,337	38,653	51	14,713	28	37,684

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 10,102 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 3,406 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 12.38 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 33.65 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,769 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,876	44	2,076	21	1.84	4.37	17.00	12.00	7,586
สิริกิตี	3,879	41	1,029	15	7.82	12.69	11.89	12.01	5,631
ภูมิพล+สิริกิตี	9,755	42	3,105	19	9.66	17.06	28.89	24.01	13,217
แควน้อยฯ	217	23	174	19	2.06	2.31	3.46	3.46	722
ป่าสักชลสิทธิ์	130	13	127	13	0.66	0.66	1.30	1.30	830
รวมทั้งหมด	10,102	41	3,406	19	12.38	20.03	33.65	28.77	14,769

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาตรน้ำใช้การ จำนวน 19 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (21%) อ่างฯ สิริกิตี (15%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (19%) อ่างฯ แม่มอก (28%) อ่างฯ น้ำพุ (14%) อ่างฯ จุฬารัตน์ (14%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (10%) อ่างฯ ลำตะคอง (26%) อ่างฯ สิรินคร (10%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (13%) อ่างฯ กระเสียว (12%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (29%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (26%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (13%) อ่างฯ คลองสิียด (12%) อ่างฯ บางพระ (28%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (26%) อ่างฯ แก่งกระจาน (29%) และอ่างฯ ปรานบุรี (15%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 251 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 294 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.11 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.59 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.98 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.36 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.54 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.54 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 106 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 136 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 91 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 16 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 56 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 58 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลป์) 7 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 14 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 139 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 153 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 9 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว 5 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 55 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 15 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 188 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 315 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		31 พ.ค. 67	1 มิ.ย. 67	2 มิ.ย. 67	4 มิ.ย. 67	5 มิ.ย. 67	6 มิ.ย. 67	7 มิ.ย. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.บุรี จ.นนทบุรี	0.22	0.20	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม.	0.26	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	ปกติ	

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 7 มิ.ย. 67	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.30	-10.50
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.82	-11.18
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.80	-10.40
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	2.52	-9.48
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.83	-9.67
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	3.29	-11.21

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ทั้งประเทศ จำนวน 11.54 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.13 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.20 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.70 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567)

ทั้งประเทศ จำนวน 13.56 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.95 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.61 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.20 ของแผน

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 7.91 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.36 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.67 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2566/67			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2566/67						ข้าวรอบที่ 2 และ 3	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	รวมข้าว	%รวมข้าว	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด	พื้นที่เก็บเกี่ยว	พื้นที่รอเก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	8.81	0.57	9.38	9.37	106.36	0.54	94.74	9.91	105.65	8.50	0.87
	นอกเขตชลประทาน	2.33	1.96	4.29	2.58	110.73	1.07	54.59	3.65	85.08	2.55	0.03
	รวม	11.14	2.53	13.67	11.95	107.27	1.61	63.64	13.56	99.20	11.05	0.90
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.91	0.13	6.04	5.92	100.17	0.09	69.23	6.01	99.50	5.68	0.24
	นอกเขตชลประทาน	1.17	0.57	1.74	1.63	139.32	0.27	47.37	1.90	109.20	1.63	-
	รวม	7.08	0.70	7.78	7.55	106.64	0.36	51.43	7.91	101.67	7.31	0.24

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 51 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 1.63 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 44 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 1.06 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 25 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.57 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุดรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ชัยนาท ตราด นครนายก สุพรรณบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 7 หน่วย 19 เที่ยวบิน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฯ เชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ อุดรธานี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และศูนย์ปฏิบัติการฯ สุราษฎร์ธานี

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง มีเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิษณุโลก กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร ทำให้มีฝนตก บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิษณุโลก(บางระกำ) กาญจนบุรี (เมือง ไทรโยค ศรีสวัสดิ์ บ่อพลอย เลาช่วญ หนองปรือ) สุพรรณบุรี(อู่ทอง สามชุก ดอนเจดีย์ ด้านข้าง หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช) อุทัยธานี(บ้านไร่ ลานสัก) ชัยนาท(หันคา สรรคบุรี เมือง) กำแพงเพชร(ปางศิลาทอง) ฉะเชิงเทรา(ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต) สระแก้ว(วังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์) ปราจีนบุรี(กบินทร์บุรี) ประจวบคีรีขันธ์(กุยบุรี เมือง) เพชรบุรี แก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง) และ จ.ชุมพร(ท่าแซะ ปะทิว เมือง)

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 6 มิถุนายน 2567)

- การปฏิบัติการฝนหลวง 113 วัน จำนวน 2,133 เที่ยวบิน (3,227:47 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 1,649.625 ตัน และปริมาณการใช้น้ำ 283,800 ลิตร พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์ จำนวน 1,181 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 71 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ น่าน พิจิตร แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุดรธานี นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง ชุมพร พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ระนอง ยะลา สตูล นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้มีฝนตก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) เขื่อนศรีนครินทร์(กาญจนบุรี) อ่างเก็บน้ำ กระเสียว(สุพรรณบุรี) อ่างเก็บน้ำทับเสลา อุทัยธานี) อ่างเก็บน้ำคลองสิียด (ฉะเชิงเทรา) เขื่อนแก่งกระจาน(เพชรบุรี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่าง ๆ ทั่วประเทศ

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบลราชธานี-บุรีรัมย์ พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ประจำสัปดาห์วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 งานระบายน้ำหลาก จำนวน 1 เครื่อง ในเขตจังหวัดนนทบุรี งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 26 เครื่อง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา นครนายก นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

6. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 67)

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย 27 มี.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่แพร่ อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีสะเกษ จันทบุรี ยะลา ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 20,978 ราย รวมพื้นที่ 58,544 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,488 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 19,805 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 35,251 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,189 ราย รวมพื้นที่ 4,352 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 659 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 250 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 3,444 ไร่ คิดเป็นเงิน 15.32 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 13 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 12.35 ไร่ วงเงิน 49,993 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.2 วาตภัย ช่วงภัย 13 มี.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ น่าน ตาก พะเยา สุโขทัย เพชรบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี หนองคาย เลย นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 543 ราย รวมพื้นที่ 1,326 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 65 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 844 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 417 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.44 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 184 ราย (คิดเป็นร้อยละ 33.89 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 633 ไร่ วงเงิน 1.33 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.70 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.3 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. - 6 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรัง สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,209 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,312,671 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 991,142 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 318,811 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,970.49 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 152,562 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,282,383 ไร่ วงเงิน 1,928.05 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.96 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา และจังหวัดยะลา เกษตรกร 989 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 11,176 ตัว แบ่งเป็น โค 1,001 ตัว กระบือ 18 ตัว สุกร 12 ตัว แพะ/แกะ 287 ตัว และสัตว์ปีก 9,858 ตัว แปลงหญ้า 1,367 ไร่ คิดเป็นเงิน 34.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

6.4 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 - 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 31,993 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 361,014 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 241,575 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 119,346 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 560.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 26,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 287,621 ไร่ วงเงิน 453.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.01 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 67)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (น่าน) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 50 ไร่	- เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ ไข่น้ำออกจากแปลงนา
	2. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และ จันทบุรี) จำนวน 36 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก
	3. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อ่างทอง) จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เฝ้าระวังหลังการเก็บเกี่ยว ไข่น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลาย หนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
	4. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และสงขลา) จำนวน 38 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่	- เมื่อพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรง ควรพ่นด้วย สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น อิติเฟนฟอส (Edifenphos) 50% EC คาร์เบนดาซิม (carbendazim) 50% SC เป็นต้น
	5. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 2,789 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 893 ไร่	- เมื่อพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล(fipronil) 5% SC อัตรา 30-50 มล. และ คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20% EC อัตรา 80-110 มล. โดยผสมน้ำพ่น 20 ลิตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. ไรสีขามะพร้าว 2. แมลงดำหนาม 3. หนอนหัวดำ 4. ดั้วแรด 5. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร และตรัง) จำนวน 476 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 16,817 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,479 ไร่ พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 45,657 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 14,316 ไร่ พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,361 ไร่ การระบาดลดลง 587 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 918 ไร่ การระบาดลดลง 217 ไร่	- ป้องกันกำจัดให้น้ำมันพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้ สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารชนิดใด ชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง - แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปลอยแตนเบียนอะซีโคเตส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปลอยแตนเบียน เตตระสติกส์ (โดยปล่อยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน) - ปลอยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอยแตนเบียน ไข่ทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเทท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และ เก็บเศษซากพืชนำไปเผานอกแปลงทันที และหมั่นสำรวจ สวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ - ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไธเลียซึม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกู่หลาบ 3. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,302 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 349 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา ยะลา สงขลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,320 ไร่ การระบาดลดลง 85 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไธเลียซึม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน - พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณ ที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย 8. ก้านทางใบเน่า	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,487 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 157 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 111 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 414 ไร่ การระบาดลดลง 119 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 97 ไร่ การระบาดลดลง 60 ไร่	- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน - ตัดแต่งใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ 85% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ - ตัดแต่งใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคก้านทางใบเน่า นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไปยังต้นอื่น ๆ หากทางใบปาล์มน้ำมันเน่ามากไป พยายามตัดแต่งทางใบแห้งออก เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา 3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 4. โรคหน้ำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี)จำนวน 1,398 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,167 ไร่ การระบาดลดลง 118 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย กระบี่ ปัตตานี พังงา และสงขลา) จำนวน 28,904 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร ชุมพร ตรัง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,807 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 24 ไร่	- คำนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยางควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 526 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่นต่อเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall amylwom)	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว และยะลา) จำนวน 300 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 132 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา และกาญจนบุรี) จำนวน 595 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 23 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้กออ้อยแตกหน่อชดเชยปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 500 ตัว/ไร่ - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคและแมลงพาหะ เมื่อพบการระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายต่ออ้อย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. ไรแดงมันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ขอนแก่น มุกดาหาร จันทบุรี ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 146 ไร่ การระบาดลดลง 155 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 15,345 ไร่ การระบาดลดลง 5,188 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 3 ไร่ การระบาด 8' muj พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุรินทร์ จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 418 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย ชัยนาท ลพบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี) จำนวน 190,485 ไร่ การระบาดลดลง 1,195 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรยกร่องแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยยาฆ่าเชื้อรา หรือฟอสฟิอัส-อะลูมิเนียม
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 14 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 122 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 11 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 8 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. ไรแดง 5. โรคราเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,241 ไร่ การระบาดลดลง 137 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 440 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 262 ไร่ การระบาดลดลง 105 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 897 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,948 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- หากพบเพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกาจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัว/ยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้งหากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง - โรคราเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไป - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคนิวโมโตหรือใบไหม้ 7. โรคนิวโมโตหรือใบไหม้ 8. เพลี้ยหอยเกล็ด 9. เพลี้ยจักจั่นฝอย 10. โรคคราดำ 11. โรคคราสีชมพู 12. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส ยะลา และสงขลา) จำนวน 234 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 611 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสงขลา) จำนวน 287 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 32 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 743 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 158 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 121 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 63 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 132 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 48 <u>การระบาดลดลง</u> 146 ไร่	- ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม เมื่อพบคราบราสีดำพ่นด้วยน้ำเปล่า - กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง หรือเผื่อนเปลือกบริเวณที่เป็นโรครอก และใช้สารคอปเปอร์-ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำทาบริเวณแผลที่ตัด - เก็บผลทุเรียนที่ถูกหนอนเจาะผลทำลายไปเก็บเผาทำลายหรือฝัง ห่อผลที่มีอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่น ใช้สารฆ่าแมลงเมื่อจำเป็น ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือคลอร์ไพริฟอส 40% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคนิวโมโต 5. โรคแอนแทรคโนส 6. โรคนิวโมโตหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 316 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 57 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 246 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 90 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 168 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และระยอง) จำนวน 85 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 64 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 240 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 6 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูก และทำลายส่วนที่เป็นโรค เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของโรคให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรมีพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 34 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 202 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 82 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 23 ไร่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทยอน 83% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา - ป้องกันแมลงพาหะ โดยใช้สารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ไอโซโพรคาร์บ 50% WP อัตรา 40 กรัม โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 21 พฤษภาคม 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 29 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 172 จุด ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้