



## รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00 น.)


### 1. สภาพอากาศ

#### 1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

#### 1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 12 มิ.ย. 67



| ที่ | อำเภอ      | จังหวัด   | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง |
|-----|------------|-----------|----------------|------------|
| 1   | อ.ฝาง      | เชียงใหม่ | 60.2           | ฝนตกหนัก   |
| 2   | อ.บึงกาฬ   | บึงกาฬ    | 46.8           | ฝนตกหนัก   |
| 3   | อ.ศรีสำโรง | สุโขทัย   | 43.3           | ฝนตกหนัก   |
| 4   | อ.เมือง    | ลำพูน     | 42.4           | ฝนตกหนัก   |
| 5   | อ.เมือง    | นครพนม    | 37.5           | ฝนตกหนัก   |

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)  
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

### 2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 67)

#### 2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,584 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,644 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (39,881 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 1,297 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 139.08 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 102.80 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 37,753 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,149 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,610 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (37,402 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 1,253 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 128.40 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 93.54 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,777 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |           |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |           |           |        |             | รวม             |                       |           |           |        |             | รับได้อีก |
|----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณภ. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณภ. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณภ. | ปริมาณน้ำ |           |        |             |           |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณภ. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณภ. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณภ. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |           |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 10,317    | 42        | 3,572  | 20          | 80              | 1,083                 | 577       | 53        | 487    | 49          | 88              | 25,908                | 10,894    | 42        | 4,058  | 21          | 15,014    |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 3,191     | 38        | 1,539  | 23          | 226             | 2,061                 | 994       | 48        | 828    | 44          | 238             | 10,429                | 4,185     | 40        | 2,367  | 27          | 6,244     |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 262       | 18        | 202    | 15          | 27              | 419                   | 120       | 29        | 96     | 24          | 30              | 1,838                 | 382       | 21        | 298    | 17          | 1,455     |
| ตะวันตก  | 2               | 26,605                | 17,123    | 64        | 3,846  | 29          | 8               | 164                   | 53        | 32        | 42     | 27          | 10              | 26,769                | 17,176    | 64        | 3,888  | 29          | 9,592     |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 504       | 33        | 409    | 29          | 52              | 1,006                 | 410       | 41        | 354    | 37          | 58              | 2,520                 | 914       | 36        | 763    | 32          | 1,607     |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 4,753     | 58        | 3,042  | 47          | 42              | 679                   | 281       | 41        | 227    | 36          | 46              | 8,874                 | 5,034     | 57        | 3,269  | 46          | 3,840     |
| รวม      | 35              | 70,926                | 36,149    | 51        | 12,610 | 27          | 435             | 5,411                 | 2,435     | 45        | 2,033  | 41          | 470             | 76,337                | 38,584    | 51        | 14,644 | 28          | 37,753    |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,992 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,296 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 36.15 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 44.83 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,879 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ     | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำรับได้อีก |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|--------------------|
|                 | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                    |
| ภูมิพล          | 5,768            | 43            | 1,968              | 20          | 1.49                | 0.60     | 28.00          | 28.00    | 7,694              |
| สิริกิตี        | 3,889            | 41            | 1,039              | 16          | 31.73               | 18.98    | 12.08          | 12.00    | 5,621              |
| ภูมิพล+สิริกิตี | 9,657            | 42            | 3,007              | 18          | 33.22               | 19.58    | 40.08          | 40.00    | 13,315             |
| แควน้อยฯ        | 211              | 22            | 168                | 19          | 2.28                | 2.58     | 3.46           | 3.46     | 728                |
| ป่าสักชลสิทธิ์  | 124              | 13            | 121                | 13          | 0.65                | 0.22     | 1.30           | 1.30     | 836                |
| รวมทั้งหมด      | 9,992            | 40            | 3,296              | 18          | 36.15               | 22.38    | 44.83          | 44.76    | 14,879             |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 19 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (20%) อ่างฯ สิริกิตี (16%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (19%) อ่างฯ แม่มอก (27%) อ่างฯ น้ำพุ (14%) อ่างฯ จุฬารามณ์ (14%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (8%) อ่างฯ ลำตะคอง (25%) อ่างฯ สิรินคร (11%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (13%) อ่างฯ กระเสียว (12%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (29%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (28%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (13%) อ่างฯ คลองสิียด (12%) อ่างฯ บางพระ (28%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (25%) อ่างฯ แก่งกระจาน (28%) และอ่างฯ ปรานบุรี (15%)

## 2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย  
แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 435 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 366 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.97 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.73 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.18 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.54 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.54 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 101 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 100 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 86 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช ) 15 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 21 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 24 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลป์) 4 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีสวภาค) 10 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 140 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 134 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 12 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว 4 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 58 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 11 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 199 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 172 ลบ.ม./วินาที)

## 2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง              | ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) |            |            |            |             |             |             | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                           | 6 มิ.ย. 67              | 7 มิ.ย. 67 | 8 มิ.ย. 67 | 9 มิ.ย. 67 | 10 มิ.ย. 67 | 11 มิ.ย. 67 | 12 มิ.ย. 67 |       |                                                                                                                                   |
| เจ้าพระยา | ปากคลองลำแด้ จ.ปทุมธานี   | 0.20                    | 0.20       | 0.21       | 0.21       | 0.21        | 0.21        | 0.21        | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร<br>- เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร<br>- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ทำนบกบปรี จ.นนทบุรี       | 0.23                    | 0.23       | 0.24       | 0.24       | 0.25        | 0.25        | 0.26        | ปกติ  |                                                                                                                                   |
| เจ้าพระยา | ทำนบกมชลประทานสามเสน กทม. | 0.24                    | 0.25       | 0.26       | 0.27       | 0.28        | 0.29        | 0.29        | ปกติ  |                                                                                                                                   |

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

## 2.4 สถานการณ์น้ำโขง

| สถานี                    | ระดับตลิ่ง | ระดับน้ำ<br>11 มิ.ย. 67 | + สูงกว่าตลิ่ง<br>- ต่ำกว่าตลิ่ง |
|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| อ.เชียงแสน จ.เชียงราย    | 12.80      | 3.24                    | -9.56                            |
| อ.เชียงคาน จ.เลย         | 16.00      | 5.27                    | -10.73                           |
| อ.เมือง จ.หนองคาย        | 12.20      | 2.08                    | -10.12                           |
| อ.เมือง จ.นครพนม         | 12.00      | 2.81                    | -9.19                            |
| อ.เมือง จ.มุกดาหาร       | 12.50      | 2.83                    | -9.67                            |
| อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 14.50      | 3.42                    | -11.08                           |

หมายเหตุข้อมูลจาก [www.drw.go.th](http://www.drw.go.th)

## 3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

### แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ทั้งประเทศ จำนวน 11.54 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.13 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.20 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.70 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567)

ทั้งประเทศ จำนวน 13.56 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.95 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.61 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.20 ของแผน

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 7.91 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.36 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.67 ของแผน

| ขอบเขตพื้นที่                    | พื้นที่แหล่งน้ำ | แผนการเพาะปลูก ปี 2566/67 |               |       | สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2566/67 |          |               |                |            |             | ข้าวรอบที่ 2 และ 3 |                        |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------------------|
|                                  |                 | ข้าวรอบที่ 2              | พืชไร่ พืชผัก | รวม   | รวมข้าว                         | %รวมข้าว | พืชไร่ พืชผัก | %พืชไร่ พืชผัก | รวมทั้งหมด | %รวมทั้งหมด | พื้นที่เก็บเกี่ยว  | พื้นที่พร้อมเก็บเกี่ยว |
| ทั้งประเทศ<br>(77 จังหวัด)       | ในเขตชลประทาน   | 8.81                      | 0.57          | 9.38  | 9.37                            | 106.36   | 0.54          | 94.74          | 9.91       | 105.65      | 8.50               | 0.87                   |
|                                  | นอกเขตชลประทาน  | 2.33                      | 1.96          | 4.29  | 2.58                            | 110.73   | 1.07          | 54.59          | 3.65       | 85.08       | 2.55               | 0.03                   |
|                                  | รวม             | 11.14                     | 2.53          | 13.67 | 11.95                           | 107.27   | 1.61          | 63.64          | 13.56      | 99.20       | 11.05              | 0.90                   |
| ลุ่มน้ำเจ้าพระยา<br>(22 จังหวัด) | ในเขตชลประทาน   | 5.91                      | 0.13          | 6.04  | 5.92                            | 100.17   | 0.09          | 69.23          | 6.01       | 99.50       | 5.68               | 0.24                   |
|                                  | นอกเขตชลประทาน  | 1.17                      | 0.57          | 1.74  | 1.63                            | 139.32   | 0.27          | 47.37          | 1.90       | 109.20      | 1.63               | -                      |
|                                  | รวม             | 7.08                      | 0.70          | 7.78  | 7.55                            | 106.64   | 0.36          | 51.43          | 7.91       | 101.67      | 7.31               | 0.24                   |

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 51 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 1.63 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 44 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 1.06 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวต นครนายก นครปฐม ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 25 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.57 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุดรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ชัยนาท ตรวต นครนายก สุพรรณบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

## 4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ สระแก้ว ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

(ฮอด จอมทอง แม่แจ่ม) กำแพงเพชร(เมือง คลองลาน โกสัมพีนคร พรานกระต่าย ขามวูลักษณ์บุรี) สุโขทัย(ศรีรีมาศ บ้านด่านลานหอย) พิจิตร (เมือง สากเหล็ก วังทรายพูน) พิษณุโลก (บางกระทุ่ม วังทอง นครไทย เนินมะปราง) เพชรบูรณ์(วังโป่ง) นครราชสีมา(สีคิ้ว สูงเนิน ปากช่อง วังน้ำเขียว ปักธงชัย ขามทะเลสอ ครบุรี หนองบุญมาก เลิงสาง โนนสูง เมืองนครราชสีมา ห้วยแถลง ด่านขุนทด โนนไทย ขามสะแกแสง พระทองคำ บ้านเหลื่อม คง พิมาย ชุมพวง ประทาย เมืองยาง ลำทะเมนชัย แก้งสนามนาง โนนแดง บัวลาย บัวใหญ่ สีดา) ขอนแก่น(หนองสองห้อง พล บ้านไผ่ บ้านแฮด โนนศิลา แวงน้อย แวงใหญ่ ชนบท โคกโพธิ์ชัย มัญจาคีรี เมือง) ชัยภูมิ (เนินสง่า คอนสวรรค์ บ้านเขว้า เมือง จัตุรัส) สุรินทร์(เมือง พนมดงรัก จอมพระ ศีขรภูมิ ชุมพลบุรี ท่าตูม ปราสาท กาบเชิง สังขะ ศรีณรงค์ ลำดวน) บุรีรัมย์(โนนดินแดง นางรอง หนองหงส์ ลำปลายมาศ เมือง ชำนิ หนองกี่ ปะคำ โนนสุวรรณ ประโคนชัย บ้านกรวด คูเมือง เฉลิมพระเกียรติ สติก บ้านด่าน ห้วยราช กระสัง พลับพลาชัย แคนดง ละหานทราย บ้านใหม่ ไชยพนธ์) ศรีสะเกษ(เมือง อุทุมพรพิสัย พยุห์ วังหิน เมืองจันทร์ น้ำเกลี้ยง ปรารค์กู๋ ขุขันธ์ ไพรบึง ห้วยทับทัน ยางชุมน้อย) ร้อยเอ็ด(เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ อาจสามารถ จตุรพักตรพิมาน เมืองสรวง) มหาสารคาม (พยัคฆภูมิพิสัย) อุทัยธานี(เมือง บ้านไร่ ห้วยคต ลานสัก หนองฉาง หนองขาหย่าง สว่างอารมณ์ ท้าทัน) ชัยนาท(หนองมะโมง วัดสิงห์) นครสวรรค์(เมือง แม่เปิน แม่वंก ชุมตาบง ลาดยาว โกรกพระ พยุหะคีรี ชุมแสง บรรพตพิสัย) สระแก้ว เมือง เขาฉกรรจ์ วัฒนานคร) ปราจีนบุรี(กบินทร์บุรี นาดี) สุราษฎร์ธานี(เวียงสระ พระแสง บ้านนาสาร) และจังหวัดนครศรีธรรมราช(ถ้าพรณรา ทุ่งใหญ่ ช้างกลาง นาบอน พิปูน ลานสกา พระพรหม พรหมคีรี เมือง ท่าศาลา ปากพั่น นบพิตำ)

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล (ตาก ลำพูน) เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน(ลพบุรี เพชรบูรณ์) เขื่อนศรีนครินทร์ อ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำทับเสลา(อุทัยธานี) อ่างเก็บน้ำนฤดินทรจินดา(ปราจีนบุรี) เขื่อนลำนะทอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำทะเมนชัย เขื่อนมูลบน(นครราชสีมา) เขื่อนลำนางรอง(บุรีรัมย์) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 28 อ่าง

#### สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 มิถุนายน 2567)

- การปฏิบัติการฝนหลวง 206 วัน จำนวน 2,159 เที่ยวบิน (3,265:27 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 1,670.725 ตัน และปริมาณการใช้น้ำ 283,800 ลิตร พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 1,181 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 71 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ น่าน พิจิตร แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ บึงกาฬ บุรีรัมย์ นครราชสีมา หนองคาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด เลย มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง ชุมพร พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ระนอง ยะลา สตูล นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้มีฝนตก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) เขื่อนศรีนครินทร์(กาญจนบุรี) อ่างเก็บน้ำกระเสียว(สุพรรณบุรี) อ่างเก็บน้ำทับเสลา อุทัยธานี) อ่างเก็บน้ำคลองสิียด (ฉะเชิงเทรา) เขื่อนแก่งกระจาน(เพชรบุรี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่าง ๆ ทั่วประเทศ

### 5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบโศก-บริโศก พิษไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ประจำสัปดาห์วันที่ 3 มิถุนายน – 9 มิถุนายน 2567 งานระบายน้ำหลาก จำนวน 1 เครื่อง ในเขตจังหวัดนนทบุรี งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 26 เครื่อง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา นครนายก นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

### 6. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 67)

#### 6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย 27 มี.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่แพร่ อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีสะเกษ จันทบุรี ปราจีนบุรี ยะลา ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 21,416 ราย รวมพื้นที่ 71,074 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,504 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 31,968 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 35,602 ไร่สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,872 ราย รวมพื้นที่ 5,443 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 659 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 208 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 4,576 ไร่ คิดเป็นเงิน 19.82 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 35 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 62.60 ไร่ วงเงิน 253,405 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

## 6.2 วาตภัย ช่วงภัย 13 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ น่าน ตาก พะเยา สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี หนองคาย เลย นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 661 ราย รวมพื้นที่ 1,521 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 80 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 910 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 531 ไร่ คิดเป็นเงิน 4.06 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 229 ราย (คิดเป็นร้อยละ 34.64 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 713 ไร่ วงเงิน 1.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 36.97 ของวงเงินช่วยเหลือ)

**ด้านประมง และด้านปศุสัตว์** ไม่ได้รับผลกระทบ

## 6.3 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. - 6 พ.ย. 66

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,209 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,312,671 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 991,142 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 318,811 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,970.49 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 152,562 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,282,383 ไร่ วงเงิน 1,928.05 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของวงเงินช่วยเหลือ)

**ด้านประมง** ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.96 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา และจังหวัดยะลา เกษตรกร 989 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 11,176 ตัว แบ่งเป็น โค 1,001 ตัว กระบือ 18 ตัว สุกร 12 ตัว แพะ/แกะ 287 ตัว และสัตว์ปีก 9,858 ตัว แปลงหญ้า 1,367 ไร่ คิดเป็นเงิน 34.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

## 6.4 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 - 18 ก.ย. 66

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 31,993 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 361,014 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 241,575 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 119,346 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 560.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 26,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 287,621 ไร่ วงเงิน 453.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.01 ของวงเงินช่วยเหลือ)

**ด้านประมง และด้านปศุสัตว์** ไม่ได้รับผลกระทบ

## 7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 67)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช               | สถานการณ์                                                                                         | การดำเนินงาน                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (น่าน)<br>จำนวน 4 ไร่ การระบาดคงที่                                        | - เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ให้น้ำออกจากแปลงนา                                                                                           |
|         | 2. โรคไหม้ข้าว         | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี และสงขลา)<br>จำนวน 46 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่ | - ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร |
|         | 3. หนอนกอข้าว          | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และ อ่างทอง)<br>จำนวน 10 ไร่ การระบาดคงที่                  | - เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลาย หนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง<br>- เมื่อพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรง ควรพ่นด้วย          |

| ชนิดพืช         | ศัตรูพืช                                                                                       | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4. โรคใบจุดสีน้ำตาล<br><br>5. หนอนห่อใบข้าว                                                    | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และสงขลา)<br>จำนวน 40 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี)<br>จำนวน 1,749 ไร่ การระบาดลดลง 1,040 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น อิติเฟนฟอส หรือคาร์เบนดาซิม<br>เป็นต้นโดยพ่นตามอัตราคำแนะนำของฉลาก<br><br>- เมื่อพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม<br>เช่น ฟิโปรนิล อัตรา 30-50 มล. และคาร์โบซัลเฟน อัตรา<br>80-110 มล. โดยผสมน้ำพ่น 20 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มะพร้าว         | 1. โรสี้ขามะพร้าว<br><br>2. แมลงดำหนาม<br><br>3. หนอนหัวดำ<br><br>4. ดั้วแรด<br><br>5. ดั้วงวง | พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ<br>กรุงเทพมหานคร อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา<br>ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี<br>สมุทรสาคร ชุมพร และตรัง)<br>จำนวน 477 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี<br>กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง<br>สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี<br>สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง<br>นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา<br>สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 16,275 ไร่ การระบาดลดลง 542 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์<br>ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร<br>จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ<br>สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์<br>เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่<br>สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี<br>พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 46,573 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 916 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร<br>จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง<br>สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์<br>เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่<br>ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต<br>สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 5,358 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี<br>ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี<br>ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา<br>นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 941 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 23 ไร่ | - ป้องกันกำจัดให้น้ำมันพ่นสารฆ่าไรในระยยะมะพร้าวติดจั่น<br>จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้<br>สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารชนิดใด<br>ชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง<br><br>- แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนาม<br>กัดกินไปเผาทำลาย ปลอยแตนเบียนอะซีโคเตส 3-5 ครั้ง<br>เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปลอยแตนเบียน<br>เตตระสติคัส (โดยปลอยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน)<br><br>- ปลอยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ<br>200 ตัว โดยปลอย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอยแตนเบียน<br>ไซทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว<br>โดยปลอย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน<br>เบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน<br><br>- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และ<br>เก็บเศษซากพืชนำไปเผานอกแปลงทันที และหมั่นสำรวจ<br>สวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ<br><br>- ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด<br>ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา<br>เมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักด้ |
| ปาล์ม<br>น้ำมัน | 1. ดั้วแรด                                                                                     | พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด<br>ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา<br>สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,269 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ<br>ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม<br>เพื่อกำจัดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน<br><br>- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ<br>โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ชนิดพืช     | ศัตรูพืช                                                                                                                          | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 2. ดั้วงกู่หลาบ<br><br>3. หนอนปลอกเล็ก<br><br>4. โรคลำต้นเน่า<br><br>5. โรคทะลายเน่า<br><br>6. โรคใบจุด<br><br>7. โรคใบจุดสาหร่าย | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 349 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,308 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 12,371 ไร่ การระบาดลดลง 116 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 159 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 110 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 422 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่ | เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน<br>- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน<br>- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด<br>- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน<br>- ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ |
| ยางพารา     | 1. โรคกลากขาว<br><br>2. โรคใบร่วงยางพารา<br><br>3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา<br><br>4. โรคหน่อยางแห้ง                           | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,430 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 32 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 4,167 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย กระบี่ ปัตตานี พังงา และสงขลา)<br>จำนวน 28,804 ไร่ การระบาดลดลง 64 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร ชุมพร ตรัง และสงขลา)<br>จำนวน 4,800 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคกลากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น<br>- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา<br>- รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ<br>- เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ                                                                                                                                                            |
| กาแฟ        | 1. โรคราสนิม<br><br>2. หนอนกาแฟสีแดง                                                                                              | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่)<br>จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่)<br>จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มันสำปะหลัง | 1. เพลี้ยแป้ง<br>มันสำปะหลัง<br><br>2. ไรแดงมันสำปะหลัง                                                                           | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น มุกดาหาร จันทบุรี และชลบุรี)<br>จำนวน 137 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี และราชบุรี)<br>จำนวน 15,340 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบต่าง<br>- ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน<br>- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ<br>- ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ชนิดพืช                | ศัตรูพืช                                                                                            | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า<br><br>4. โรคพุ่มแจ้<br><br>5. โรคใบด่าง<br>มันสำปะหลัง                        | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี)<br>จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุรินทร์ จันทบุรี และชลบุรี)<br>จำนวน 446 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์<br>สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ<br>นครราชสีมา บุรีรัมย์ Mukdahan Yasothon Roi Et<br>ศรีสะเกษ สุรินทร์หนองคายอุดรธานีชัยนาทลพบุรี<br>จันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีระยองสระแก้ว<br>กาญจนบุรีเพชรบุรีและราชบุรี)<br>จำนวน 191,172 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 688 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ<br>- ควรยกร่องแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่<br>ท่อนพันธุ์ด้วยยาฆ่าเชื้อรา หรือฟอสฟิออร์-อะลูมิเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อ้อย                   | 1. หนอนกออ้อย<br><br>2. โรคใบขาว<br><br>3. ด่างหนวดยาว                                              | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา และ<br>กาญจนบุรี)<br>จำนวน 595 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา)<br>จำนวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี)<br>จำนวน 3 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย<br>ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง<br>ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 500 ตัว/ไร่<br>- ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง<br>เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว<br>หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลด<br>แหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคและแมลงพาหะ เมื่อพบ<br>การระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายต่ออ้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ข้าวโพด<br>เลี้ยงสัตว์ | 1. หนอนกระทู้ข้าวโพด<br>ลายจุด (fall armyworm)                                                      | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว<br>กาญจนบุรี และยะลา)<br>จำนวน 301 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW)<br>แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่<br>หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สับปะรด                | 1. โรคเหี่ยว                                                                                        | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และประจวบคีรีขันธ์)<br>จำนวน 506 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป็นต่อเก่า<br>สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ทุเรียน                | 1. เพลี้ยไฟ<br><br>2. เพลี้ยไก่แจ้<br><br>3. เพลี้ยแป้ง<br><br>4. ไรแดง<br><br>5. โรครากเน่าโคนเน่า | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร<br>นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,266 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง<br>กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา สตูล<br>และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 443 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่<br>ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 256 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่<br>ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 835 ไร่ การระบาดลดลง 62 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง<br>ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช<br>นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา<br>และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 3,973 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ | - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่<br>อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลเฟน เลือกใช้สารชนิดใด<br>ชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่<br>ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม<br>อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิด<br>หนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน<br>- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด<br>ส่วนที่ถูกทำลายทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ<br>ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย<br>- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้<br>สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพรีไคด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา<br>30 มล. หรือเอคซีไทอะซอกซ์อัตรา 40 มล. โดยเลือกใช้สารชนิดใด<br>ชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน<br>- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบด่างหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร<br>ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม<br>คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้ |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                                    | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 6. โรคใบติดหรือใบไหม้<br>7. โรคใบจุดสาหร่าย<br>8. เพลี้ยหอยเกล็ด<br>9. เพลี้ยจักจั่นฝอย<br>10. โรคราดำ<br>11. โรคราสีชมพู<br>12. หนอนเจาะผล | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส ยะลา และสงขลา)<br>จำนวน 247 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 13 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 639 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 28 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสงขลา)<br>จำนวน 284 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 800 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 57 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 117 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 132 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 53 <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่ | สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นทีละใบให้ทั่วทั้งต้น<br>- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคลังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช<br>- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวด์ออกยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ<br>- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลเฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน/ไพฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน<br>- เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง<br>- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ ผสมน้ำขุ่นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด<br>- ห่อผลด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไป และสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็นต้องใช้ ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน อัตรา 20 มล. โดยพ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน พ่น 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน ควรตรวจก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน |
| เงาะ    | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. โรคใบจุดสาหร่าย<br>3. หนอนคืบกินใบ<br>4. โรคราแป้ง                                                                      | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี)<br>จำนวน 14 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)<br>จำนวน 111 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 11 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี)<br>จำนวน 8 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง<br>- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์<br>- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ในระยะที่ต้นเงาะแตกใบอ่อนถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มังคุด  | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. หนอนกินใบ<br>3. หนอนซอนใบ<br>4. โรคใบจุด                                                                                  | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และนราธิวาส)<br>จำนวน 294 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 22 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 246 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 164 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 82 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้งขณะที่มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง<br>- เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน<br>- เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม หรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                        | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 5. โรคแอนแทรกโนส<br><br>6. โรคใบจุดสาหร่าย                                      | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร)<br>จำนวน 64 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส)<br>จำนวน 236 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่                                                                                                                                                                                                          | คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br><br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br><br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ลำไย    | 1. เพลี้ยแป้ง<br><br>2. โรคราดำ<br><br>3. โรคพุ่มไม้กวาด<br><br>4. หนอนคืบกินใบ | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร)<br>จำนวน 39 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และจันทบุรี)<br>จำนวน 199 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 82 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (น่าน พะเยา และจันทบุรี)<br>จำนวน 238 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 215 ไร่ | - หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br><br>- พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม<br><br>- หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง<br><br>- เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักนำไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามคำแนะนำในฉลาก |

## 8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 21 พฤษภาคม 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 29 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 172 จุด ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา เลย มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก อุดรดิตถ์ พิจิตร สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้