



## รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 (เวลา 15.00 น.)

### 1. สภาพอากาศ


#### 1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

บริเวณภาคตะวันออก รวมทั้งด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนบน (ฝั่งตะวันออก) มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศอ่าวตังเกี๋ย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “แคมี” บริเวณช่องแคบไต้หวัน คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันนี้ (25 ก.ค. 2567) โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้ไว้ด้วย

#### 1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 24 ก.ค. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 25 ก.ค. 67



| ที่ | อำเภอ       | จังหวัด   | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง  |
|-----|-------------|-----------|----------------|-------------|
| 1   | อ.ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 117.5          | ฝนตกหนักมาก |
| 2   | อ.แม่สอด    | ตาก       | 109.1          | ฝนตกหนักมาก |
| 3   | อ.อุ้มผาง   | ตาก       | 51.0           | ฝนตกหนัก    |
| 4   | อ.เมือง     | ชุมพร     | 47.0           | ฝนตกหนัก    |
| 5   | อ.ทุ่งช้าง  | น่าน      | 27.4           | ฝนตกปานกลาง |

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)  
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

### 2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 67)

#### 2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 39,450 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 15,508 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (38,477 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 973 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 312.60 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 124.89 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 36,887 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 36,663 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,124 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (35,889 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 773 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 282.74 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 99.93 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,263 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |           |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |           |           |        |             | รวม             |                       |           |           |        |             | รับได้อีก |
|----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             |           |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |           |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 10,022    | 40        | 3,277  | 18          | 80              | 1,083                 | 607       | 56        | 517    | 52          | 88              | 25,908                | 10,629    | 41        | 3,794  | 20          | 15,279    |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 3,704     | 44        | 2,052  | 31          | 226             | 2,061                 | 1,191     | 58        | 1,024  | 54          | 238             | 10,429                | 4,895     | 47        | 3,076  | 36          | 5,534     |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 283       | 20        | 223    | 16          | 27              | 419                   | 158       | 38        | 133    | 34          | 30              | 1,838                 | 441       | 24        | 357    | 20          | 1,396     |
| ตะวันตก  | 2               | 26,605                | 17,346    | 65        | 4,069  | 31          | 8               | 164                   | 46        | 28        | 35     | 23          | 10              | 26,769                | 17,392    | 65        | 4,103  | 30          | 9,377     |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 627       | 41        | 533    | 38          | 52              | 1,006                 | 530       | 53        | 474    | 50          | 58              | 2,520                 | 1,157     | 46        | 1,007  | 42          | 1,363     |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 4,681     | 57        | 2,970  | 46          | 42              | 679                   | 255       | 38        | 201    | 32          | 46              | 8,874                 | 4,936     | 56        | 3,171  | 45          | 3,938     |
| รวม      | 35              | 70,926                | 36,663    | 52        | 13,124 | 28          | 435             | 5,411                 | 2,787     | 52        | 2,384  | 48          | 470             | 76,337                | 39,450    | 52        | 15,508 | 30          | 36,887    |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,742 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,046 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 69.07 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 25.19 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,129 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ     | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำรับ<br>ได้อีก |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                 | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                        |
| ภูมิพล          | 5,119            | 38            | 1,319              | 14          | 10.94               | 13.84    | 12.00          | 12.00    | 8,343                  |
| สิริกิตี        | 4,280            | 45            | 1,430              | 21          | 35.77               | 47.45    | 8.00           | 8.00     | 5,230                  |
| ภูมิพล+สิริกิตี | 9,400            | 41            | 2,750              | 17          | 46.71               | 61.29    | 20.00          | 20.00    | 13,572                 |
| แควน้อยฯ        | 217              | 23            | 174                | 19          | 11.85               | 11.05    | 4.32           | 4.32     | 722                    |
| ป่าสักชลสิทธิ์  | 125              | 13            | 122                | 13          | 10.51               | 9.21     | 0.87           | 0.87     | 835                    |
| รวมทั้งหมด      | 9,742            | 39            | 3,046              | 17          | 69.07               | 81.55    | 25.19          | 25.19    | 15,129                 |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 14 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (14%) อ่างฯ สิริกิตี (21%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (19%) อ่างฯ แม่มอก (17%) อ่างฯ น้ำพุ (20%) อ่างฯ จุฬารัตน์ (20%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (19%) อ่างฯ ลำตะคอง (21%) อ่างฯ สิรินธร (25%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (13%) อ่างฯ กระเสียว (15%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (29%) อ่างฯ คลองสิียด (16%) และอ่างฯ ปราณบุรี (16%)

## 2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,135 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,169 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +20.44 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.26 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหล 800 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 700 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.15 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.38 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +10.10 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.64 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝางตะวันออก รวม 180 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 181 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 131 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช ) 39 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 10 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 49 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 36 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 62 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 16 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีสวภาค) 20 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝางตะวันตก รวม 340 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 342 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 22 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว 10 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 160 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 100 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 48 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 857 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 650 ลบ.ม./วินาที)

## 2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง               | ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) |            |            |            |            |            |            | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                                                          |
|-----------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           |                            | 19 ก.ค. 67              | 20 ก.ค. 67 | 21 ก.ค. 67 | 22 ก.ค. 67 | 23 ก.ค. 67 | 24 ก.ค. 67 | 25 ก.ค. 67 |       |                                                                                   |
| เจ้าพระยา | ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี     | 0.15                    | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.14       | 0.13       | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร<br>- เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ทำนบกม.บุรี จ.นนทบุรี      | 0.23                    | 0.22       | 0.21       | 0.19       | 0.19       | 0.19       | 0.17       | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร                                      |
| เจ้าพระยา | ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม. | 0.24                    | 0.24       | 0.23       | 0.22       | 0.21       | 0.20       | 0.18       | ปกติ  |                                                                                   |

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

## 2.4 สถานการณ์น้ำโขง

| สถานี                    | ระดับตลิ่ง | ระดับน้ำ<br>23 ก.ค. 67 | + สูงกว่าตลิ่ง<br>- ต่ำกว่าตลิ่ง |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|
| อ.เชียงแสน จ.เชียงราย    | 12.80      | 3.98                   | -8.82                            |
| อ.เชียงคาน จ.เลย         | 16.00      | 7.52                   | -8.48                            |
| อ.เมือง จ.หนองคาย        | 12.20      | 4.86                   | -7.34                            |
| อ.เมือง จ.นครพนม         | 12.00      | 7.19                   | -4.81                            |
| อ.เมือง จ.มุกดาหาร       | 12.50      | 6.98                   | -5.52                            |
| อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 14.50      | 9.36                   | -5.14                            |

หมายเหตุข้อมูลจาก [www.drw.go.th](http://www.drw.go.th)

## 3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

### สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์ นครสวรรค์ ลพบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์ (กาบเชิง สังขะ บัวเขต) นครสวรรค์ (หนองบัว ท่าตะโก ตากฟ้า ไผ่ศาลี) ลพบุรี (หนองม่วง) และ จ.เพชรบูรณ์ (บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ)

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ลพบุรี เพชรบูรณ์) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 3 อ่าง

### สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 กรกฎาคม 2567)

การปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 2,833 เที่ยวบิน (4,260:77 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 133.025 ตัน ปริมาณการใช้น้ำ 283,800 ลิตร และปฏิบัติการโดย Ground Base Generator (GBG) จำนวน 14 ครั้ง พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 1,181 นัด ทรายงานพื้นที่ฝนตก รวม 70 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ น่าน พิจิตร แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ บึงกาฬ บุรีรัมย์ นครราชสีมา หนองคาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด เลย มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชุมพร พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ระนอง ยะลา สตูล นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#### 4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-บุรี โภค-บุรี โภค พิษไร และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ประสบภัย วันที่ 8 – 22 กรกฎาคม 2567 งานระบายน้ำหลาก จำนวน 1 เครื่อง ในเขตจังหวัดนนทบุรี งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ในเขตจังหวัดเพชรบุรี

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้ง 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

#### 5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 67)

##### 5.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย 13 มี.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 3,618 ราย รวมพื้นที่ 12,204 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 706 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,437 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 7,061 ไร่ คิดเป็นเงิน 38.31 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 9.62 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 881 ไร่ วงเงิน 3.48 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.10 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

##### 5.2 วาตภัย ช่วงภัย 13 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ น่าน ตาก พะเยา สุโขทัย ศรีสะเกษ เพชรบุรี นครสวรรค์ ลำพูน อุทัยธานี หนองคาย เลย กาญจนบุรี นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตรด ตรัง สตูล นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 804 ราย รวมพื้นที่ 1,598 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 80 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 904 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 614 ไร่ คิดเป็นเงิน 4.38 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 634 ราย (คิดเป็นร้อยละ 78.86 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,480 ไร่ วงเงิน 3.98 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 90.80 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

##### 5.3 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. - 6 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรด สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,209 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,312,671 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 991,142 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 318,811 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,970.49 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 152,642 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,283,299 ไร่ วงเงิน 1,929.31 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตรด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.96 ล้านบาท ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ ลำพูน อุดรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี นราธิวาส และจังหวัดยะลา เกษตรกร 989 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 11,176 ตัว แบ่งเป็น โค 1,001 ตัว กระบือ 18 ตัว สุกร 12 ตัว แพะ/แกะ 287 ตัว และสัตว์ปีก 9,858 ตัว แปลงหญ้า 1,367 ไร่ คิดเป็นเงิน 34.02 ล้านบาท ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว

#### 5.4 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 - 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 31,993 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 361,014 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 241,575 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 119,346 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 560.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 31,258 ราย (คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 348,449 ไร่ วงเงิน 542.26 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 96.76 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

#### 6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 67)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                   | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. โรคไหม้ข้าว<br>2. หนอนกระทู้กล้า<br>3. แมลงหี้ยข้าว<br>4. หนอนห่อใบข้าว | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร และสงขลา)<br>จำนวน 120 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 110 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา สุรินทร์ และ อุบลราชธานี)<br>จำนวน 225 ไร่ การระบาดลดลง 1,125 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุโขทัย ชัยนาท อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา)<br>จำนวน 39,343 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 38,893 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี)<br>จำนวน 802 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 802 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก พ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร<br>- กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัยของหนอนกระทู้กล้า ถ้ามีความจำเป็นในการใช้ สารเคมีควรสาดฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 20 มล. หรือเฟนิโตรไทออน อัตรา 30 มล. เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลาย<br>- เมื่อพบแมลงหี้ยข้าวข้าวเป็นจำนวนมาก กรณีที่จำเป็นต้องใช้สารเคมี สามารถใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยใช้อัตราตามคำแนะนำในฉลาก<br>- เมื่อพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล อัตรา 30-50 มล. และคาร์โบซัลแฟน อัตรา 80-110 มล. โดยผสมน้ำพ่น 20 ลิตร                                                                                                                                                                  |
| มะพร้าว | 1. หนอนหัวดำ<br>2. แมลงดำหนาม<br>3. โรสสีขามะพร้าว                         | พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 44,189 ไร่ การระบาดลดลง 446 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 13,254 ไร่ การระบาดลดลง 179 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และชุมพร)<br>จำนวน 451 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ | - ปลอ้ยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปลอ้ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอ้ยแตนเบียน ไช้ทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปลอ้ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซไทพ โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน<br>- แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปลอ้ยแตนเบียนอะซีโคเดส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว<br>- ป้องกันกำจัดให้น้ำมันพ่นสารฆ่าไรในระยมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กละห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้ สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง<br>- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และ เก็บเศษซากพืชนำไปเผานอกแปลงทันที และหมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ<br>- ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตตาโรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ |

| ชนิดพืช         | ศัตรูพืช                                                                                                                                        | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4. ตัวงวง<br><br>5. ตัวแรด                                                                                                                      | พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 960 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 5,335 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 27 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ปาล์ม<br>น้ำมัน | 1. ตัวแรด<br><br>2. ตัวงูหลาย<br><br>3. หนอนปลอกเล็ก<br><br>4. โรคลำต้นเน่า<br><br>5. โรคทะลายเน่า<br><br>6. โรคใบจุด<br><br>7. โรคใบจุดสาหร่าย | พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,292 ไร่ การระบาดลดลง 113 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นราธิวาส พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 253 ไร่ การระบาดลดลง 145 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,216 ไร่ การระบาดลดลง 143 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 12,195 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 60 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 171 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 111 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง)<br>จำนวน 316 ไร่ การระบาดลดลง 39 ไร่ | - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับตัวแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน<br>- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน<br>- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน<br>- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด<br>- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ขอดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจน<br>- ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผา ทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดของรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ |
| ยางพารา         | 1. โรคกลากขาว<br><br>2. โรคใบร่วงยางพารา                                                                                                        | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 2,010 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 750 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 2,742 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 755 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคกลากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น<br>- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ชนิดพืช                | ศัตรูพืช                                                                                                                                                        | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 3. โรคใบร่วงชนิดใหม่<br>ของยางพารา<br><br>4. โรคหน่ายางแห้ง                                                                                                     | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย กระบี่<br>นราธิวาส ปัตตานี พังงา และสงขลา)<br>จำนวน 120,066 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร ชุมพร<br>ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 4,876 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - รมรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา<br>อยู่ในช่วงผลัดใบ<br>- เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง<br>ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ<br>จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| กาแฟ                   | 1. โรคราสนิม<br><br>2. หนอนกาแฟสีแดง                                                                                                                            | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่)<br>จำนวน 8 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่)<br>จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ<br>เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มันสำปะหลัง            | 1. เพลี้ยแป้ง<br>มันสำปะหลัง<br><br>2. ไรแดงมันสำปะหลัง<br><br>3. โรคโคนเน่าหัวเน่า<br><br>4. โรคพุ่มแจ้<br><br>5. โรคใบด่าง<br>มันสำปะหลัง<br><br>6. หนอนกระทู | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สกลนคร จันทบุรี ชลบุรี และ<br>สระแก้ว)<br>จำนวน 139 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์<br>สกลนคร สุรินทร์ ชลบุรี ระยอง และกาญจนบุรี)<br>จำนวน 14,350 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2,090 ไร่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา และ<br>ชลบุรี)<br>จำนวน 83 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์ สุรินทร์ จันทบุรี<br>และชลบุรี)<br>จำนวน 428 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก พิจิตร<br>นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์<br>ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร<br>ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์หนองคาย อุบลราชธานี<br>ชัยนาท ลพบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี<br>ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี)<br>จำนวน 175,410 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1,734 ไร่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุบลราชธานี และชัยนาท)<br>จำนวน 38 ไร่ <u>การระบาดลดลง 514 ไร่</u> | - ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย<br>ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง<br>- ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ<br>ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน<br>- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย<br>ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ<br>- ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง<br>การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย<br>มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ<br>- ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่<br>ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิไลด-อะลูมิเนียม<br>- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ<br>ดักด้วในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร<br>สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ<br>หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์<br>ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ<br>มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วอลโวโพลีโคโนไวรัส หรือ เอ็นพีวี<br>หนอนกระทูหอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน |
| ข้าวโพด<br>เลี้ยงสัตว์ | 1. หนอนกระทูข้าวโพด<br>ลายจุด (fall armyworm)                                                                                                                   | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว<br>สตูล และยะลา)<br>จำนวน 32 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ควบคุมการระบาดของหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด (FAW)<br>แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่<br>หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สับปะรด                | 1. โรคเหี่ยว                                                                                                                                                    | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และประจวบคีรีขันธ์)<br>จำนวน 554 ไร่ <u>การระบาดลดลง 30 ไร่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปักตอเก่า<br>สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| อ้อย                   | 1. หนอนกออ้อย<br><br>2. โรคใบขาว<br><br>3. โรคเส้ดำ                                                                                                             | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา)<br>จำนวน 45 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา)<br>จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สระแก้ว)<br>จำนวน 153 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน<br>ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง<br>ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ปล่อยแมลงหางหนีบ<br>อัตรา 500 ตัว/ไร่<br>- ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง<br>เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                                                                                       | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 4. ตัวหนอนดียว                                                                                                                                                                                 | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี)<br>จำนวน 200 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคและแมลงพาหะ เมื่อพบการระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายต่ออ้อย<br>- เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอาการแฉ่ำดำ ควรตัดแฉ่ำดำออกขณะเริ่มปรากฏอาการ ก่อนที่เชื้อหุ้มแฉ่ำดำจะหลุดออกนำไปใส่ถุงไปทำลายนอกแปลงปลูก<br>- ในแหล่งที่พบการระบาด หลังวางท่อนพันธุ์ควรมีการฉีดพ่นด้วยสารแขวนลอยของเชื้อราเขียว จีงกลบ จะสามารถป้องกันตัวหนอนได้ประมาณ 1 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ทุเรียน | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. เพลี้ยไก่แจ้<br>3. เพลี้ยแป้ง<br>4. ไรแดง<br>5. โรครากเน่าโคนเน่า<br>6. โรคใบติดหรือใบไหม้<br>7. โรคใบจุดสาหร่าย<br>8. เพลี้ยหอยเกล็ด<br>9. เพลี้ยจักจั่นฝอย<br>10. โรคคราดำ | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 948 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 134 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 433 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 11 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 248 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 748 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 61 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (เลย จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 4,324 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 250 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส ยะลา และสงขลา)<br>จำนวน 291 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 14 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 731 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสงขลา)<br>จำนวน 291 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,094 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 15 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 122 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ | - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน<br>- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย<br>- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซีอัตรา 40 มล. โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน<br>- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น<br>- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช<br>- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ<br>- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน/ไพฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน<br>- เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และสารเหนียวที่แมลงปากดูดซับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อ |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                             | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 11. โรคราสีชมพู<br>12. หนอนเจาะผล<br>13. หนอนเจาะเมล็ด                                               | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 146 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 74 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 29 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุดรดิตถ์ นราธิวาส ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสตูล)<br>จำนวน 6,546 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6,421 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                | สาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง<br>- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราสีชมพูให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด<br>- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขบกลางเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน หรือ คาร์บาริล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เงาะ    | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. โรคใบจุดสาหร่าย<br>3. หนอนคืบกินใบ<br>4. โรคราแป้ง                               | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่)<br>จำนวน 5 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงราย จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)<br>จำนวน 166 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และจันทบุรี)<br>จำนวน 17 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                             | - ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง<br>- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์<br>- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบในระยะที่ต้นเงาะแตกใบอ่อนถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มังคุด  | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. หนอนกินใบ<br>3. หนอนซอนใบ<br>4. โรคใบจุด<br>5. โรคแอนแทรคโนส<br>6. โรคใบจุดสาหร่าย | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และนราธิวาส)<br>จำนวน 255 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 287 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 208 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 113 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร)<br>จำนวน 79 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส)<br>จำนวน 293 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ | - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้งขณะที่มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง<br>- เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน<br>- เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 30-80 กรัม หรือคาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น |
| ลำไย    | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. โรคราดำ<br>3. โรคพุ่มไม้กวาด                                                     | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร)<br>จำนวน 43 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และจันทบุรี)<br>จำนวน 193 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 91 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 14 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม<br>- หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช        | สถานการณ์                                                                           | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 4. หนอนคืบกินใบ | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และจันทบุรี)<br>จำนวน 14 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 6 ไร่ | - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแด้ไปทำลาย<br>หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปด้าไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร |

## 7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 21 พฤษภาคม 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 29 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 172 จุด ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา เลย มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก อุดรธานี พิจิตร สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้